

Enterovirussen (4 types) (nonpolio)	2	Ontsteking van maag en darm, hartafwijkingen, hersenvliesontsteking	Via aanhoesten of direct contact met neus- en/of keelslijm, vocht uit blaren en ontlasting van besmette personen	Onbekend	Rioolwerkers, Plantsoenwerkers
Hantaanvirus	3	Longontsteking met bloeding en shock	beet, waarschijnlijk ook contact met urine, speeksel	Middel-Hoog	Rioolwerkers, Muskusratvangers
Hepatitis A	2	De incubatietijd is twee tot zes maanden. Door een infectie kan men zich erg ziek voelen, echter soms merkt men, ondanks dat men besmettelijk is voor anderen, er niets van. Vermoeihied, lichte koorts, pijn in de buik en misselijkheid. Geelzucht. Het virus verdwijnt in de meeste gevallen binnen een half jaar.	Hepatitis-A wordt overgebracht door het eten en drinken van voedsel of water dat verontreinigd is met uitwerpselen	Hoog	Rioolwerkers, Muskusratvangers
Hepatitis B	3	Het ziektebeeld lijkt op Hepatitis A. De verschijnselen van acute hepatitis B zijn: plotseling opkomende moeheid, gebrekkige eetlust, spier- en gewrichtspijnen, koorts (griepig gevoel), geelzucht (verkleuren van huid, oogwit, ontlasting en urine) en soms jeuk. Sommige mensen krijgen helemaal geen ziekteverschijnselen. Bij ernstig verlopende hepatitis (minder dan 1%) kan sufheid en eventueel coma (bewusteloosheid) optreden. Dit kan tot de dood leiden.	Het hepatitis B-virus (HBV) wordt voornamelijk overgebracht via bloed-bloedcontact, via seksueel verkeer en 'verticaal' tijdens de geboorte van moeder op kind.	Hoog	Huis- en zwerfvuilbeladers
Hepatitis E	2	echter met een ernstiger vorm van leverontsteking	Hepatitis-E wordt overgebracht door het eten en drinken van voedsel of water dat verontreinigd is met uitwerpselen	Laag	Rioolwerkers
Parvovirus	2	Algehele malaise. Aansluitend ziekteverschijnselen als huiduitslag en gewrichtsklachten. Deze duren in de regel enkele dagen tot twee weken. Patiënten die niet in staat zijn antistoffen tegen het virus te maken, zullen een chronische bloedarmoede ontwikkelen.	De ziekte is erg besmettelijk en wordt via druppelinfectie van mens op mens overgedragen	Hoog	Rioolwerkers

